

Athens International Symposium

Advances and Perspectives in Geriatric Oncology

www.geriatriconcology-greece.com

17-18

201

February 2017 Divani Caravel Hotel Athens, Greece

Under the Auspices of:



Organized by:

- the Hellenic Society of Medical Oncology, Greece
- the Senior Adult Oncology Program of H. Lee Moffitt Cancer Center & Research Institute, Tampa, USA



Abraxane[®]
paclitaxel albumin



Α. Κηφισίας 274, 152 32 Χαλάνδρι
Τηλ.: 210 6771500, Fax: 210 6896619
e-mail: info@genesishpharma.com
www.genesishpharma.com



Welcome Address

Dear Colleagues,

On behalf of the members of the Organizing and Scientific Committee, it is our pleasure to welcome you to the International Athens Symposium on “Advances and Perspectives in Geriatric Oncology” that is being held at the Divani Caravel Hotel in Athens, February 17-18th, 2012. This event will provide an international forum for discussion of current and emerging concepts in the management of cancer in senior adult patients. A prestigious international faculty representing various disciplines involved in cancer care and research has been assembled to review and analyze diagnosis and treatment of elderly cancer patients, as well as clinical research in the field. The Symposium will feature round tables, panel discussion of challenging cases, invited lectures and meet the expert and poster discussion sessions.

We are looking forward to an exciting meeting!

On Behalf of the Board of Directors of Hesmo

Vassilis Georgoulas, MD, PhD
Professor of Medical Oncology
President of HeSMO

The Symposium Co-Chairs

Lodovico Balducci, MD
Senior Adult Oncology Program,
H. Lee Moffitt Cancer Center
& Research Institute

Demetris Papamichael, MD, FRCP
Bank of Cyprus Oncology Center

Athanasios Athanasiadis, MD
Larissa General Hospital
Secretary of HeSMO



Votrient[®]
pazopanib



ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Votrient 200mg: Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 200 mg pazopanib (ως υδροχλωρική)

Votrient 400mg: Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 400 mg pazopanib (ως υδροχλωρική)



GlaxoSmithKline
Oncology

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο επιστημονικό τμήμα της εταιρείας:
Λ. Κηφισίας 266, Χαλάνδρι 152 32, τηλ. 210 6882100

Symposium Co-Chairs:

Lodovico Balducci, Tampa, FL, USA
Demetris Papamichael, Nicosia, Cyprus
Athanasios Athanasiadis, Larissa, Greece

Organizing Committee:

Matti Aapro (CH)
Riccardo Audisio (UK)
Martine Extermann (USA)
Athanasios Karampeazis (GR)
Dimitrios Kardamakis (GR)
Athanasios Pallis (BE)
Lampros Vamvakas (GR)
Hans Wildiers (BE)

Scientific Committee

Local Scientific Committee:

S. Agelaki (GR)
I. Athanasiadis (GR)
D. Bafaloukos (GR)
T. Economopoulos (GR)
E. Efstathiou (GR)
C. Emmanouilidis (GR)
V. Georgoulas (GR)
J. Gioulbasanis (GR)
H. Gogas (GR)
K. Iliadis (GR)
S. Kakolyris (GR)
A. Kotsakis (GR)
N. Maniadas (GR)
D. Mavroudis (GR)
D. Misailidou (GR)
C. Papandreou (GR)
N. Pavlidis (GR)
A. Polyzos (GR)
J. Souglakos (GR)
K. Syrigos (GR)

International Scientific Committee:

D. Andreopoulos (CY)
V. Anisimov (RU)
L. Baider (IL)
L. Biganzoli (IT)
J. J. Body (BE)
H. Charalampous (CY)
A. de Gramont (FR)
J.P. Droz (FR)
J. Fitzpatrick (IE)
A. Giagounidis (DE)
R. Glynne Jones (UK)
M. Gosney (UK)
C. Gridelli (IT)
I. Irminger-Finger (CH)
G. Ladas (UK)
C. La Vecchia
P. Maione (IT)
S. Monfardini (IT)
G. Plataniotis (UK)
P. Pronzato (IT)
L. Repetto (IT)
D. Sargent (USA)
A. Simm (DE)
C. Terret (FR)
G. Vlastos (CH)
S. Yalcin (TR)

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ PFS

GR1202024562

 NOVARTIS

Novartis (Hellas) A.E.B.E.
12ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας,
144 51 Μεταμόρφωση,
Τηλ.: 210 28 11 712
www.novartis.gr

Γραφείο Θεσσαλονίκης
12ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Ν. Μουδανιών
570 01 Θέρμη,
τηλ.: 2310 424 039

ΦΑΡΜΑΚΟΕΠΑΓΡΥΠΠΗΣΗ: 210 2828812

Friday, February 17, 2012

08.30-09.30 Registration

09.30-09.45 Welcome address

V. Georgoulis (GR): Hellenic Society of Medical Oncology (HeSMO)

L. Balducci (USA): H. Lee Moffitt Cancer Center & Research Institute

D. Papamichael (CY): Symposium Organizing Committee

9.45-11.15 Round Table: **"Biology of Aging and Cancer"**

Chairs: **L. Balducci (USA), K. Syrigos (GR)**

Genetic and epigenetic changes in aging: when tumor suppressors get bad: **I. Irminger-Finger (CH)**

Interface of aging and cancer: **V. Anisimov (RU)**

Aging and cancer: the issues: **L. Balducci (USA)**

11.15-11.45 COFFEE BREAK

11.45-13.15 Lectures: **"Special issues"**

Chairs: **I. Irminger-Finger (CH), A. Polyzos (GR)**

Biomarkers of aging: **A. Simm (DE)**

The role of the geriatrician in the management of older cancer patient: **M. Gosney (UK)**

Geriatric Oncology: Caregivers' Unsteady Path: **L. Baider (IL)**

13.15-15.00 LUNCH & Poster Viewing

15.00-16.15 Round Table: **"Geriatric Assessment"**

Chairs: **C. Terret (FR), D. Kardamakis (GR)**

Geriatric Assessment: what the clinician needs to know:

L. Repetto (IT)

How to integrate comorbidities in clinical practice:

M. Extermann (USA)

How Geriatric Assessment may direct the treatment of cancer:

L. Balducci (USA)

NEO

AMGEN
Oncology

Amgen Ελλάς Ε.Π.Ε.
Γροβιάς 4
151 25 Μαρούσι
Τηλ: 210 344 7000
Fax: 210 344 7050

©2010 Amgen Inc. All rights reserved

prolia[®]
denosumab

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή:

Συμπληρώστε την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ" Αναφέρατε:

- ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για τα Neo φάρμακα
- Τις ΣΟΒΑΡΕΣ ανεπιθύμητες ενέργειες για τα Γνωστά φάρμακα



Οι ύψιστες απαιτήσεις ασφάλειας θα γίνουν να αναφέρονται στον ΕΟΦ με το έντυπο της Κίτρινης Κάρτας ή ηλεκτρονικά (βλ. ιστοσελίδα ΕΟΦ www.efpa.gr) Τηλ: +30 210 8507547 ή αναλογισθείτε στην AMGEN Ελλάδα, Οργανισμός Ε.Π.Ε. Τηλ: +30 210 3447000

16.15-17.30 Round Table: “Clinical Research in geriatric oncology”

Chairs: **H. Wildiers (BE), A. Pallis (BE)**

Organization of the clinical activity of a Geriatric Oncology

Department: **S. Monfardini (IT)**

Health economics and epidemiology of the elderly: **N. Maniadakis (GR)**

Elderly-specific clinical trials: novel trial design and relevant
end-points: **C. Terret (FR)**

17.30-18.00 COFFEE BREAK & POSTER VIEWING

18.00-19.15 Round Table: “Supportive care”

Chairs: **P. Pronzato (IT), C. Papandreou (GR)**

Growth factors: **P. Pronzato (IT)**

Cancer cachexia in elderly patients: **J. Gioulbasanis (GR)**



19.15-20.00 The SIOG perspective

Chairs: **S. Monfardini (IT), S. Agelaki (GR)**

Geriatric oncology: The 10 priorities **M. Extermann (USA)**

R. Audisio (UK)

20.00 WELCOME COCKTAIL RECEPTION



Η πηγή πληροφόρησής σας:
www.avastin.gr

AVASTIN[®]
bevacizumab
Leading angiogenesis
inhibition

Saturday, February 18, 2012

09.00-10.00 Meet the expert: "Prostate cancer in elderly patients"

Chairs: **I. Athanasiadis (GR), H. Charalampous (CY)**

The management of early prostate cancer in senior adults:

J. Fitzpatrick (IE)

New perspectives in the management of advanced prostate cancer in older men: **E. Efstathiou (GR)**

10.00-11.30 Round Table: "Breast cancer in the elderly"

Chairs: **A. Athanasiadis (GR), D. Mavroudis (GR)**

Surgical approach of the older cancer patient with breast cancer:

G. Vlastos (CH)

Adjuvant chemotherapy for older patients: **H. Wildiers (BE)**

Adjuvant hormonotherapy: Tam vs Als: **L. Biganzoli (IT)**

Radiotherapy: **G. Plataniotis (UK)**

11.30-12.00 COFFEE BREAK & POSTER VIEWING

12.00-13.00 Lectures: "Novel treatment in the elderly"

Chairs: **D. Bafaloukos (GR), T. Economopoulos (GR)**

Melanoma: **H. Gogas (GR)**

MDS: **A. Giagounidis (DE)**

13.00-14.00 Poster Visiting Session

**I. Athanasiadis (GR), L. Vamvakas (GR), M. Extermann (USA),
C. Emmanouilidis (GR), A. Athanasiadis (GR)**

13.00-15.00 LUNCH & POSTER VIEWING

15.00-16.30 Round Table: "Lung Cancer"

Chairs: **A. Kotsakis (GR), S. Yalcin (TR)**

Surgical approach for the older patient with NSCLC: **K. Iliadis (GR)**

Role of RT-(stereotactic RT): **D. Misailidou (GR)**

Systemic treatment: **P. Maione (IT)**

16.30-17.30 Round table: "Colorectal Cancer"

Chairs: **J. Souglakos (GR), D. Andreopoulos (CY)**

Surgery issues in elderly colorectal cancer patients: **R. Audisio (UK)**

Radiotherapy issues in elderly rectal cancer patients:

R. Glynne-Jones (UK)



ZOMETA®
zoledronic acid 
Protect what is essential



Novartis (Hellas) A.E.B.E.
Τ.Θ.52001,
144 10 Μεταμόρφωση,
Τηλ.: 210 28 11 712
www.novartis.gr

Γραφείο Θεσσαλονίκης
12ο χλμ. Θεσσαλονίκης -
Ν. Μουδανιών
570 01 Θέρμη
τηλ.: 2310 424 039

ΦΑΡΜΑΚΟΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ: 210 2828812

17.30-18.00 COFFEE BREAK

18.00-19.00 Debate “Adjuvant chemotherapy in elderly patients with colorectal cancer”

Chairs: **R. Audisio (UK), D. Papamichael (CY)**

Pro: **A. de Gramont (FR)**

Con: **D. Sargent (USA)**

19.00-20.00 Tumor Board: “Challenging cases of elderly patients with NSCLC, breast and colorectal cancer”

Chair: **L. Balducci (USA), V.Georgoulas (GR)**

Presenters: **A. Karampeazis (GR), A. Pallis (BE)**

Discussants: Colorectal cancer: **D. Papamichael (CY)**

Breast cancer: **H. Wildiers (BE)**

NSCLC: **P. Maione (IT)**

20.00 CLOSING REMARKS

Tyverb®

lapatinib



**Αποτελεσματικότητα
σε 1η* και 2η* γραμμή
στον HER2 + MKM**



GlaxoSmithKline
Oncology

* αφορά συγκεκριμένη ένδειξη (βλ. Οδηγίες χρήσης)

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει μονοϋδρική λαπατινίλη dicyclate, που ισοδυναμεί με 250 mg λαπατινίλη. **ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:** Το Tyverb® σε συνδυασμό με κατεπατρίνη, ενδείκνυται για τη θεραπεία ασθενών με προχωρημένο ή μεταστατικό καρκίνο του μαστού των οποίων οι όγκοι υπερεκφράζουν το ErbB2 (HER2). Οι ασθενείς πρέπει να έχουν προίσα νόσο κατόπιν προηγούμενης θεραπείας που περιλάμβανε ανθρακινικές και ταξάνες και θεραπεία με τραστοζουμίνη στη μεταστατική φάση, σε συνδυασμό με ένα αναστολέα αρωματάσης για μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με μεταστατική νόσο βελική ή ορμονικά υποδοχή, οι οποίες επί του παρόντος δεν προσρίζονται για χημειοθεραπεία. Οι ασθενείς στη μελέτη έγκρισης δεν είχαν προηγούμενως λάβει τραστοζουμίνη ή ένα αναστολέα αρωματάσης (βλέπε παράγραφο 5.1). **ΑΝΤΕΔΕΙΞΕΙΣ:** Υπερευαίσθητοι στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα. Παρακαλείστε να ανατρέξετε στις συνταγογραφικές πληροφορίες της κατεπατρίνης για σχετικές αντενδείξεις και για πληροφορίες ασφαλείας όταν χορηγείται λαπατινίλη σε συνδυασμό με κατεπατρίνη. Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση. Η λαπατινίλη έχει σχετιστεί με αναρροή για μείωση του κλάσματος εξώθησης αριστερής κοιλίας (LVEF) (βλέπε παράγραφο 4.8). Εξισοτρίστε προσοχή όταν πρόκειται να χορηγηθεί λαπατινίλη σε ασθενείς με νόσους που θα μπορούσαν να προκαλέσουν εξασθένιση της λειτουργίας της αριστερής κοιλίας. Το LVEF πρέπει να αξιολογείται σε όλες τις ασθενείς πριν από την έναρξη της θεραπείας με λαπατινίλη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το αρχικό LVEF της ασθενούς βρίσκεται εντός των φυσιολογικών ορίων του ιδρύματος. Η αξιολόγηση του LVEF πρέπει να συνεχίζεται κατά τη διάρκεια της θεραπείας με λαπατινίλη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το LVEF δεν μειώνεται σε μη αποδεκτό επίπεδο. Η λαπατινίλη έχει σχετιστεί με αναρροή πνευμονικής τοξικότητας περιλαμβανομένης της διμεσής πνευμονοπάθειας και της πνευμονίτιδας. Οι ασθενείς πρέπει να παρακολουθούνται για τυχόν συμπτώματα πνευμονικής τοξικότητας. Με τη χρήση λαπατινίλης έχει εμφανιστεί ηπατοκυτταρική και σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να είναι θανατηφόρα. Η ηπατική λειτουργία (προσπαράγοντες, γλυκερυνίλη και αλκαλική φωσφατάση) θα πρέπει να παρακολουθείται πριν την έναρξη της θεραπείας και στη συνέχεια κάθε μήνα, ή όπως ενδείκνυται κλινικά. Η δοσολογία της λαπατινίλης θα πρέπει να διακόπτεται εάν οι μεταβολές της ηπατικής λειτουργίας είναι σοβαρές και δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται στους ασθενείς. Συνιστάται προσοχή εάν η λαπατινίλη συνταγογραφείται σε ασθενείς με μέτρια ή σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία. Συνιστάται προσοχή εάν η λαπατινίλη συνταγογραφείται σε ασθενείς με σοβαρά νεφρική δυσλειτουργία. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας με λαπατινίλη έχουν αναφερθεί περιστατικά διάρροιας, συμπεριλαμβανομένης της σοβαρής διάρροιας. Η προληπτική αντιμετώπιση της διάρροιας με αντιδιαρροϊκά φάρμακα είναι σημαντική. Για το σοβαρό περιστατικό διάρροιας μπορεί να απαιτηθεί η χορήγηση από τον στόματος ή ενδοφλέβιας

ως ηλεκτρολυτών και υγρών, καθώς και η προσωρινή ή η αριστική διακοπή της θεραπείας με λαπατινίλη. Η παράλληλη θεραπεία με επιογινεΐνη του CYP3A4 πρέπει να αποφεύγεται λόγω του κινδύνου μωμενής έκθεσης στη λαπατινίλη. Η παράλληλη θεραπεία με ισχυρούς αναστολείς του CYP3A4 πρέπει να αποφεύγεται λόγω του κινδύνου αυξημένης έκθεσης στη λαπατινίλη. Η κατανάλωση χυμού γκρέιφρου πρέπει να αποφεύγεται κατά τη διάρκεια της θεραπείας με λαπατινίλη. Η συγχρόνηση λαπατινίλης με φαρμακευτικών προϊόντων με περιορισμένο θεραπευτικό εύρος που είναι υποστρώματα του CYP3A4 ή CYP2C8 πρέπει να αποφεύγεται. Η ταυτόχρονη χορήγηση με ουσίες που αυξάνουν το γαστρικό pH πρέπει να αποφεύγεται, καθώς η διαλυτότητα και η απορρόφηση της λαπατινίλης μπορεί να μειωθούν. Αντιεμετωγικές ενέσεις. Η ασφαλεία της λαπατινίλης αξιολογήθηκε σε σχήμα μονοθεραπείας ή συνδυασμού με άλλες χημειοθεραπείες για διάφορους τύπους καρκίνου, περιλαμβανομένων ασθενών που έλαβαν λαπατινίλη σε συνδυασμό με κατεπατρίνη. Οι πλέον συχνές ανεπιθύμητες αντιδράσεις (>25%) κατά τη διάρκεια της θεραπείας με λαπατινίλη συν κατεπατρίνη ήταν από γαστρεντερικές (διάρροια, ναυτία και έμετος) ή δερματολογικές (παλμο-πελματιαία ερυθροδυσαισθησία (PPE) και εξάνθημα). Η επίπτωση PPE ήταν παρόμοια στο σκέλος θεραπείας της λαπατινίλης συν κατεπατρίνη και στο σκέλος μονοθεραπείας με κατεπατρίνη. Η διάρροια ήταν η συχνότερη ανεπιθύμητη αντίδραση που οδηγεί σε διακοπή της θεραπείας και η επίπτωσή της ήταν παρόμοια στις δύο ομάδες θεραπείας (λαπατινίλη συν κατεπατρίνη: 5%, κατεπατρίνη: 3%). Για την πρόληψη των ανεπιθύμητων ενεργειών ανάλογα με τη συχνότητά τους, χρησιμοποιήθηκε η ακόλουθη συνδυαστική: πολύ συχνές (1/10), συχνές (1/100 έως <1/10), όχι συχνές (1/1.000 έως <1/100), σπάνιες (1/10.000 έως <1/1.000) και πολύ σπάνιες (<1/10.000), μη γνωστές (δεν μπορούν να εκτιμηθούν με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα). Εντός κάθε κατηγορίας συχνότητας εμφάνισης, οι ανεπιθύμητες ενέργειες παρατηρούνται κατά φθίνουσα σειρά σοβαρότητας. Οι παρακάτω ανεπιθύμητες αντιδράσεις έχει αναφερθεί ότι σχετίζονται με τη λαπατινίλη: Καρδιακές διαταραχές – Συχνές: Μειωμένο κλάσμα εξώθησης αριστερής κοιλίας, διαταραχές του αντισπασμωδικού συστήματος, ταχυκαρδία και του μεσοθωρακίου. Οι συχνές διαμέση πνευμονο-πνευμονοπνευμονίτιδα, διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος – Πολύ συχνές: Διάρροια, που μπορεί να προκαλέσει αφυδάτωση, ναυτία, έμετος, διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού – Πολύ συχνές: Εξάνθημα (συμπεριλαμβανομένης δερματίτιδας οξείας/αργής ή σκληρής). Διαταραχές του μεταβολισμού και της βολής – Πολύ συχνές: Αυξημένη. Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης – Πολύ συχνές: Κόπωση, διαταραχές του ήπατος και των χοληφόρων – Συχνές: Υπερχοληστεριναιμία, ηπατοτοξικότητα. Οι παρακάτω επιπρόσθετες ανεπιθύμητες αντιδράσεις έχει αναφερθεί ότι σχετίζονται με τη λαπατινίλη σε συνδυασμό με κατεπατρίνη με διάφορα συχνότητες μεγαλύτερη από 5% σε σύγκριση με τη μονοθεραπεία κατεπατρίνης: Διαταραχές

του γαστρεντερικού συστήματος – Πολύ συχνές: Δυσπεψία, διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού – Πολύ συχνές: Ψηροδερμία. Επιπλέον, οι παρακάτω ανεπιθύμητες αντιδράσεις αναφέρθηκαν ότι σχετίζονται με τη λαπατινίλη σε σχήμα συνδυασμού με κατεπατρίνη, αλλά εμφανίστηκαν σε παρόμοια συχνότητα στο σκέλος μονοθεραπείας κατεπατρίνης: Διαταραχές του νευρικού συστήματος – Συχνές: Κεφαλαλγία, διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος – Πολύ συχνές: Στασιμότητα, δυσκολία στην αναπνοή, διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού – Πολύ συχνές: Πάλλομο-πελματιαία ερυθροδυσαισθησία. Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού – Πολύ συχνές: Άλγος στο άκρο, οσφυαλγία. Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης – Πολύ συχνές: Φλεγμονή βλεννογόνου. Ψυχιατρικές διαταραχές – Πολύ συχνές: Άσπνία Μειωμένο κλάσμα εξώθησης αριστερής κοιλίας: Μειώσεις του κλάσματος εξώθησης αριστερής κοιλίας (LVEF) έχουν αναφερθεί στο 1% περίπου των ασθενών που έλαβαν λαπατινίλη και ήταν ασυμπτωματικές σε περισσότερες από το 90% των περιπτώσεων. Οι μειώσεις του LVEF υποχώρησαν ή βελτιώθηκαν σε πάνω από το 80% των περιστατικών μετά από διακοπή της θεραπείας με λαπατινίλη. Συμπτωματικές μειώσεις του LVEF παρατηρήθηκαν στο 0,1% περίπου των ασθενών που έλαβαν μονοθεραπεία με κατεπατρίνη. Στα παρατηρηθέντα συμπτώματα περιλαμβάνονταν δύσπνοια, καρδιακή ανεπάρκεια και οίδημα ποδιών. Όλα τα συμβάντα υποχώρησαν αμέσως μετά τη διακοπή της λήψης της λαπατινίλης. Μειώσεις του LVEF αναφέρθηκαν στο 2,9% των ασθενών που έλαβαν λαπατινίλη σε συνδυασμό με κατεπατρίνη, έναντι ποσοστού 1,0% στην ομάδα της μονοθεραπείας με κατεπατρίνη. Διάρροια: Διάρροια εμφανίστηκε στο 65% περίπου των ασθενών που έλαβαν λαπατινίλη σε συνδυασμό με κατεπατρίνη. Τα περισσότερα περιστατικά διάρροιας ήταν βαθμού 1 ή 2 και δεν οδήγησαν σε διακοπή της θεραπείας με λαπατινίλη. Η διάρροια ανταποκρίνεται καλά στην προληπτική αγωγή (βλέπε παράγραφο 4.4). Εξάνθημα: Εξάνθημα εμφανίστηκε στο 28% περίπου των ασθενών που έλαβαν λαπατινίλη σε συνδυασμό με κατεπατρίνη. Το εξάνθημα ήταν γενικά χαμηλού βαθμού και δεν οδήγησε σε διακοπή της θεραπείας με λαπατινίλη. **ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** Glaxo Group Limited, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB8 3NN, Ηνωμένο Βασίλειο. **ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** EU/1/07/440/001-003. **Ημερομηνία πρώτης έγκρισης:** 10/05/2008. **Ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης:** 12/05/2008.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή:
Συμμετέχετε στην "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"
Αναφέρατε:

- **ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες ενέργειες για τα **Νέα φάρμακα** [N]
- Τις **ΣΟΒΑΡΕΣ** ανεπιθύμητες ενέργειες για τα **Γνωστά φάρμακα**

Speakers

Agelaki S.	Assistant Professor in Medical Oncology, University General Hospital of Heraklion, Greece
Andreopoulos D.	Director, Department of Radiation Oncology and Diagnostic Radiology, Bank of Cyprus Oncology Centre, Nicosia, Cyprus
Anisimov V.	Professor, Head, Department of Carcinogenesis and Oncogerontology, N.N. Petrov Research Institute of Oncology, St. Petersburg, Russia
Athanasiadis A.	MD, PhD, Medical Oncologist, Director, Oncology Dept., General Hospital of Larissa, Greece
Athanasiadis I.	MD, Medical Oncologist, Director of the Oncology Section, MITERA Hospital, Hygeia Polis, Greece
Audisio R.	MD, FRCS, Honorary Professor - University of Liverpool, Consultant Surgical Oncologist - St Helens Teaching Hospital, SIOG President, United Kingdom
Bafaloukos D.	Medical Oncologist, Head of 1st Oncology Clinic, Metropolitan Hospital of Athens, Greece
Baider L.	Full Professor of Medical Psychology, Hebrew University of Jerusalem. Medical School, Director, Psycho-Oncology, Institute of Oncology, Hadassah University Hospital, Jerusalem, Israel
Balducci L.	MD, Program Leader, Senior Adult Oncology Program, Professor of Oncologic Sciences, USF College of Medicine, H. Lee Moffitt Cancer Center, Tampa, Florida, USA
Biganzoli L.	Director of the Clinical Research Unit and responsible of the Geriatric Oncology Program at the Sandro Pitigliani Medical Oncology Unit, Hospital of Prato, Istituto Toscano Tumori, Prato, Italy
Charalambous H.	BM (Soton) MRCP (UK) FRCR (UK), Consultant Clinical Oncologist, Bank of Cyprus Oncology Centre, Nicosia, Cyprus
DeGramont A.	Professor, Department of Medical Oncology, Hospital Saint-Antoine, France
Economopoulos T.	Professor, Medical School, University of Athens, Greece
Efstathiou E.	Lecturer of Medical Oncology, School of Medicine, University of Athens, Greece
Emmanouilidis C.	Medical Oncologist, Medical Center Interbalkan, Greece
Extermann M.	Senior Member at H. Lee Moffitt Cancer Center and Professor of Oncologic Sciences, College of Medicine, University of South Florida, Tampa, Florida, USA
Fitzpatrick J.	Professor, University College Dublin, School of Medicine and Medical Science, Mater Misericordiae University Hospital, University College Dublin, Ireland
Georgoulas V.	MD, Professor of Medical Oncology, University of Crete - President of HeSMO, Greece
Giagounidis A.	MD, Head of Clinical Research Unit, Helios St. Johannes Klinik, Medizinische Klinik II, Duisburg, Germany
Gioulbasanis J.	MD, PhD, Medical Oncologist, Department of Medical Oncology, University Hospital of Larissa, University of Thessaly School of Medicine, Larissa, Greece
Glynn-Jones R.	FRCP, FRCR, Consultant Clinical Oncologist, Macmillan Lead Clinician in Gastro-Intestinal Cancer Mount Vernon Cancer Centre, Northwood, HA6 2RN, United Kingdom
Gogas H.	Associate Professor, University of Athens, Greece
Gosney M.	Professor, Director, Clinical Health Sciences, University of Reading, United Kingdom

- Iliadis K.** MD, FETCS, Thoracic Surgeon, Director of Thoracic Surgery Dept., "YGEIA" Hospital, Greece
- Irminger-Finger I.** Doctor, PhD, University Hospitals Geneva, Head of Molecular Gynecology and Obstetrics Laboratory, Visiting Professor, University of Cagliari, Switzerland
- Karampeazis A.** MD, Medical Oncologist, 401 Army General Hospital, Athens, Greece
- Kardamakidis D.** Professor, MD, PhD, DMRT, Radiation Oncologist, Department of Radiation Oncology, University of Patras Medical School, Greece
- Kotsakis A.** MD, PhD, Lecturer of Medical Oncology, University of Crete, Greece
- Maione P.** MD, Division of Medical Oncology, "S. G. Moscati" Hospital, Avellino, Italy
- Maniadakis N.** BSc, MSc, PhD, FESC, Professor and Department Director, Health Services Organisation & Management, National School of Public Health, Athens, Greece
- Mavroudis D.** MD, Professor of Medical Oncology, University of Crete, Greece
- Misailidou D.** M.D, PH.D Radiation Oncologist Interbalkan Medical Center, Director Papageorgiou Hospital Thessaloniki, Greece
- Monfardini S.** Professor, Division of Geriatric Oncology, Fondazione Den Gnocchi, Milano, Italy
- Pallis A.G.** MD, MSc, PhD, Clinical Research Physician, Medical-Oncologist, Brussels, Belgium
- Papamichael D.** MD, Consultant Medical Oncologist, Director, Department of Medical Oncology, Bank of Cyprus Oncology Center, Nicosia, Cyprus
- Papandreou C.** M.D., Ph.D., Assoc. Professor of Medicine – Oncology, Head, Department of Medical Oncology, University of Thessaly School of Medicine, Larissa, Greece
- Plataniotis G.** MD, PhD, Consultant in Clinical Oncology, Beacon Oncology Centre, Somerset, United Kingdom
- Polyzos A.** Professor, Medical Oncologist, University of Athens, A' Propaedeutic Medical Clinic "LAIKO", Greece
- Pronzato P.** Professor, Department of Medical Oncology, Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro, Genova, Italy
- Repetto L.** Doctor, Director Oncology, ASL 1 Imperiese, Italy
- Sargent D.** Professor of Biostatistics and Oncology, Mayo Clinic, Group Statistician, Alliance for Clinical Trials in Oncology, USA
- Simm A.** Professor, Research Director of the University Clinic for Cardiac and Thoracic Surgery, German
- Souglakos J.** MD, PhD, Lecturer of Medical Oncology, Faculty of Medicine, University of Crete, Greece
- Syrigos K.** M.D., Ph.D., Assoc. Professor & Head, Oncology Unit GPP, Sotiria General Hospital, Athens School of Medicine, GR, Vis. Professor of Thoracic Oncology, Yale School of Medicine, USA
- Terret C.** MD, PhD, Programme d'Oncogériatrie, Département de Médecine, Lyon, France
- Vamvakas L.** MD, Medical Oncologist, Department of Medical Oncology, University General Hospital of Heraklion, Greece
- Vlastos G.** PD, Doctor, Head of Breast Unit, Geneva University Hospital, Geneva
- Wildiers H.** Assoc. Professor, Department of General Medical Oncology/ Multidisciplinary Breast Centre, University Hospitals Leuven, Leuven, Belgium
- Yalcin S.** Prof. of Medicine, Hacettepe University, Institute of Oncology, Medical Oncology Department, Ankara, Turkey

Geriatric Oncology Abstracts

- 1. Does multidimensional geriatric assessment (MGA) predict all-cause survival in a prospective cohort of 1038 elderly cancer patients?**
Basso U., Falci C., Brunello A., Zafferri V., Fiduccia P., Sergi G., Lonardi S., Lamberti E., Castegnaro E., Soldà C., Cossutta F., Chiarion-Sileni V., Monfardini S., Roma A., Borgato L., Zagonel V.
- 2. Efficacy and safety of Trastuzumab (T) plus chemotherapy (CT) in elderly patients (pts) aged $\geq$ 70 years with advanced breast cancer (BC): updated results of a multicenter study in north-east Italy**
Brunello A., Bolshinsky M., Falci C., Luciani A., Crivellari D., Maruzzo M., Puglisi F., Molino A., Mustacchi G., Beda M., Monfardini S., Basso U., Zagonel V.
- 3. Comprehensive Care of Older People with Cancer: A Geriatricians Experience**
Bafadhel L., Kelly J., Gosney M.
- 4. Risk analysis for thoracic surgery in elderly lung cancer patients**
Lukavetsky N., Fetsych T.
- 5. Primary carcinosarcoma of the breast in an elderly woman**
Tsoukalas N., Tolia M., Papakostidi A., Koumakis G., Barbounis V., Apostolikas N., Efremidis A.
- 6. Plasma cell leukemia in an elderly man with multiple myeloma-plasmatocytoma**
Tsoukalas N., Tataridou T., Aloizos G., Kolokithopoulos D., Voudri Y., Tegos K.
- 7. Comparison of the predictive and prognostic value of Mini Nutritional Assessment (MNA) and Glasgow Prognostic Score (GPS) in elderly patients with metastatic Non Small Cell Lung Cancer**
Makridou M., Perdikouri I., Bacavou Hr., Papadopoulos V., Vasiliou Chr., Vaiou M., Giannousi Z., Zafeiriou A., Kakalou D., Gioulbasanis I., Papandreou CN.
- 8. Breast cancer in the elderly: The role of radiotherapy**
Alexopoulou E., Pomoni M., Katiniotis G., Spyropoulou D., Koukouras D., Kardamakis D.
- 9. Use of granulocyte growth factor in an elderly population receiving chemotherapy and radiotherapy**
Kouroufexi A., Theophanous-Kitiri S., Polykarpou G., Leotsinidis M., Kardamakis D., Papadimitriou E.
- 10. Application of the VES-13 survey in an elderly population receiving radiotherapy: A pilot study**
Katiniotis G., Katinioti K., Filippatos K., Alexopoulou E., Spyropoulou D., Leotsinidis M., Kardamakis D.
- 11. Palliative chemotherapy in elderly patients with common metastatic malignancies: A Hellenic Cooperative Oncology Group registry analysis of management, outcome and clinical benefit predictors**
Rallis G., Karavasilis V., Andreadou A., Sfakianaki I., Pentheroudakis G., Pavlidis N.

- 12. Evaluation of skin radiation toxicity related to fractionation schedule in elder breast cancer patients**
Markouizou A., Kalaitzakis G., Xydis K., Georgakopoulou K., Bouga G., Karagiannis V., Paraskevaides M.
- 13. Multidisciplinary approach of head and neck cancer in the elderly population**
Mountzios G., Soultati A., Kentepozidis N., Syrigos K.
- 14. Prevalence and correlates of emotional distress among elderly patients with cancer at the beginning of chemotherapy**
Iconomou G., Peroukides S., Viha A., Assimakopoulos K., Kardamakis D., Kalofonos H.P.
- 15. A phase I trial of the carboplatin/gemcitabine doublet as first-line treatment for elderly patients with squamous non-small-cell lung cancer (NSCLC)**
Pallis A.G., Vamvakas L., Karampeazis A., Agelaki S., Chandrinos V., Polyzos A., Koinis F., Stoltidis D., Vardakis N., Georgoulis V.
- 16. Efficacy and treatment tolerance in older patient with metastatic colorectal cancer (mCRC): a meta-analysis of two irinotecan-based phase III randomized trials conducted by the Hellenic Oncology Research Group (HORG)**
Vamvakas L., Karampeazis A., Kakolyris S., Polyzos A., Boukovinas I., Papadimitraki E., Asimakopoulou N., Papakonstantinou P., Georgoulis V., Souglakos J.
- 17. Cyclophosphamide and pegylated doxorubicin (myoset®) in elderly women with HER-2 negative locally advanced or metastatic breast cancer: preliminary results of a multicenter phase II trial from the Hellenic Oncology Research Group (HORG)**
Karampeazis A., Ardavanis A., Kentepozidis N., Bozionelou V., Papakotoulas P., Tryfonidis K., Saloustros E., Mavroudis D., Georgoulis V., Vamvakas L.
- 18. Paclitaxel and bevacizumab as first-line treatment in elderly women with HER-2 negative locally advanced or metastatic breast cancer: preliminary results of a multicenter phase II trial from Hellenic Oncology Research Group (HORG)**
Vamvakas L., Karampeazis A., Ardavanis A., Saloustros E., Kalbakis K., Zafeiriou Z., Kalykaki A., Nikolaou Ch., Georgoulis V., Mavroudis D.
- 19. Pemetrexed compared with erlotinib in pre-treated patients with advanced non-small-cell lung cancer (NSCLC): A subgroup analysis for patients over 65 years of age, including geriatric assessment correlation, of a randomized phase III Hellenic Oncology Research Group (HORG) trial**
Karampeazis A., Vamvakas L., Pallis A.G., Agelaki S., Kentepozidis N., Christophyllakis C., Boukovinas I., Kontopodis E., Kotsakis A., Georgoulis V.
- 20. Surgical management of colorectal cancer in geriatric patients. The experience of a greek peripheral hospital.**
Paschos K., Liappis A., Tselios D., Georgiou E., Boulas K., Charalampidis Ch., Vrakas X.

- 21. Targeted agents and older patients with advanced or metastatic NSCLC: a balance between clinical benefit and tolerance.**
Ramfidis V.S., Mountzios G., Kentepozidis N., Syrigos K.N.
- 22. Correlation of breast volume and acute skin toxicity in two different radiation fractionation schedules in elderly women with early stage breast cancer**
Beli I., Piperis M., Soulimioti G., Gianakopoulos S., Fitousi N., Tsiakiri E., Boinis K., Athanassiou E.
- 23. Acute toxicity of concurrent chemo-radiotherapy in young and elderly patients with rectal carcinoma- comparative results**
Piperis M., Soulimioti G., Beli I., Kountouri M., Maravelis I., Kouridou V., Boinis K., Athanassiou E.
- 24. Palliative approach with etoposide in elderly patient with advanced lung cancer**
Heras P., Spiliopoulou A., Lampropoulos C., Bechli A., Niarou V., Salesiotou V.
- 25. The impact of cancer and its treatment on the physical functioning and depression symptomatology of geriatric cancer patients.**
Heras P., Lampropoulos Ch., Spiliopoulou A., Bechli A., Goritsas I.
- 26. Gemcitabine in combination with docetaxel and capecitabine in previously untreated patients with advanced pancreatic cancer: comparative effectiveness and tolerability in older versus younger patients**
Xenidis N., Chelis L., Amaranidis K., Chamalidou E., Dimopoulos P., Christakidis E., Koukaki T., Kakolyris S.
- 27. Differential effect of adjuvant taxane-based and taxane-free chemotherapy regimens on the CK-19 mRNA-positive circulating tumor cells in elderly patients with early breast cancer**
Xenidis N., Chelis L., Amaranidis K., Chamalidou E., Dimopoulos P., Christakidis E., Kakolyris S., Georgoulas V.
- 28. Cabazitaxel (CAB) in docetaxel pretreated Castration Resistant Prostate Cancer (CRPC). Preliminary results with focus to safety in elderly patients**
Ntokou A., Kaltsas S., Stamatopoulou S., Markos L., Pouliou E., Agrogianni N., Tsoukalas Gr., Zilis D., Florou K., Gkeka D., Staurinidis H., Ardavanis A.
- 29. Clinical, epidemiological characteristics and outcome in elderly patients with Non-small cell lung cancer (NSCLC) treated with chemotherapy**
Vaslamatzis M.M., Laskarakis A., Soultati A., Kapou T., Papanikolaou S., Stathopoulos Ch., Alevizopoulos N., Delaki K., Patila E., Zoumblios Ch.
- 30. A phase II study of the combination of bevacizumab with cytotoxic chemotherapy, as first line treatment, in older patients with advanced/metastatic NSCLC (non-squamous).**
Pallis A.G., Vamvakas L., Karampeazis A., Polyzos A., Agelaki S., Kentepozidis N., Boukovinas I., Kotsakis A., Aggelidou A., Georgoulas V.
- 31. Small cell lung cancer and Takotsubo cardiomyopathy**
Visvardis E.E., Tziaferi V., Farnsworth J., Broomhead R., Wasan H., Kilpatrick D.



ΕΡΩΡΑΤΙΟ ADV 2/3-11

TEVA

Erporatio®

Epoetin theta

TEVA Pharmaceuticals Hellas S.A.

Λ. Κηφισίας 166Α & Σοφοκλέους 2, 151 26 Μαρούσι, Ελλάδα, Τηλ: +30 21072 79099, www.tevapharm.com

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας: ratiopharm GmbH (Μέλος του ομίλου TEVA)

Auspices, CME's

Under the Auspices of:



European Society for Medical Oncology



Ελληνική Εταιρεία Γηριατρικής Ογκολογίας



International Society of Geriatric Oncology

CME accreditation:

The event has been awarded by:



with 16 ESMO-MORA cat. 1 points

Greek Medical Association (P.I.S.) with 12 CME- CPD credits

The Symposium Secretariat



SCEP-Scientific - Cultural Events and Publications
Tel.: +30 210.7240039/+30 210.7240608
Fax: +30 210.7240139
scep_ath@otenet.gr

Platinum Sponsors



We Innovate Healthcare

Gold Sponsors



Silver Sponsors



Bronze Sponsors



Sponsors



Myocet®

(liposomal doxorubicin)



Cephalon®
Oncology



ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ Α.Ε.
Λ. Κηφισίας 274 152 32 Χαλάνδρι,
Αθήνα Τηλ.: 210-8771500
Fax: 210-6891918, 210-6859786
e-mail: info@genesishpharma.com
www.genesishpharma.com



SANOFI ONCOLOGY 

Sanofi-aventis A.E.B.E. Λεωφ. Συγγρού 348, Κτήριο Α', 176 74 Καλλιθέα
Τηλ.: 210 90 01 600, Fax: 210 92 49 088 www.sanofi.gr


JEVTANA[®]
(cabazitaxel)